

RX

PRAVASTATIN

Comprimés de pravastatine sodique 10 mg, USP

Comprimés de pravastatine sodique 20 mg, USP

Comprimés de pravastatine sodique 40 mg, USP

DIN 02476142

DIN 02476150

DIN 02476169



FORMAT		TAILLE RÉELLE
BO	100	Comprimés

FORMAT		TAILLE RÉELLE
BO	100	Comprimés

FORMAT		TAILLE RÉELLE
BO	100	Comprimés



Recto : P10 Verso : I



Recto : P20 Verso : I



Recto : P40 Verso : I

PRODUIT DE RÉFÉRENCE
PRAVACHOL®
(BRISTOL-MYERS SQUIBB)

AV-AG-PRAVASTATIN

FORCE	FORMAT	CODE UPC	McKesson	Familiprix	McMahon	K&F	DP+
10 mg	BO 100	622082 29163 5	—	127816	—	—	291635
20 mg	BO 100	622082 29164 2	—	127330	—	—	291642
40 mg	BO 100	622082 29165 9	—	127329	—	—	291659

06 janv. 2020

RX

PRAVASTATIN

INFORMATIONS PRODUIT

USAGE THÉRAPEUTIQUE	Régulateur du métabolisme lipidique
CLASSE THÉRAPEUTIQUE	24:06.08 Inhibiteurs de la HMG-CoA réductase «statines»
INDICATION	<p>Hypercholestérolémie Indiqué comme complément à un régime (au moins un équivalent du régime du panel III de traitement de l'adulte [ATP III TLC diet]) pour la réduction des taux élevés de cholestérol total et de cholestérol lié aux lipoprotéines à basse densité (C-LDL) chez les patients atteints d'hypercholestérolémie primaire (Types IIa et IIb), lorsque la réponse au régime alimentaire et à d'autres mesures non pharmacologiques s'est avérée inadéquate.</p> <p>Prévention primaire des incidents coronariens Indiqué pour : <ul style="list-style-type: none"> - Réduire le risque d'infarctus du myocarde - Réduire le risque de devoir subir une revascularisation du myocarde - Réduire le risque de mortalité totale en réduisant les décès cardiovasculaires. </p> <p>Prévention secondaire des incidents cardiovasculaires Indiqué pour : <ul style="list-style-type: none"> - Réduire le risque de mortalité totale - Réduire le risque de décès en raison d'une coronaropathie - Réduire le risque d'infarctus du myocarde - Réduire le risque de devoir subir une revascularisation du myocarde - Réduire le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) et d'accident ischémique transitoire (AIT) - Réduire le taux l'hospitalisation total </p>
INGRÉDIENT ACTIF	Pravastatine (sous forme de pravastatine sodique)
INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX	Lactose anhydre, croscarmellose sodique, crospovidone, oxyde de magnésium, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline et povidone.
DURÉE DE CONSERVATION	24 mois
ENTREPOSAGE	Conserver entre 15-30 °C à l'abri de la l'humidité et de la lumière.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

		UNITÉS	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)
Caisse	10 mg - Bo 100	192	27	34.8	35.3	6.9
Unité	10 mg - Bo 100	1	3.9	3.9	7.85	0.03
Caisse	20 mg - Bo 100	192	27	34.8	35.3	8.8
Unité	20 mg - Bo 100	1	3.9	3.9	7.85	0.04
Caisse	40 mg - Bo 100	216	45.4	41.5	27.8	15.8
Unité	40 mg - Bo 100	1	4.77	4.77	7.92	0.06