

RX

CLOPIDOGREL


Comprimés de clopidogrel 75 mg, norme du fabricant

DIN 02431971

PRODUIT DE RÉFÉRENCE
PLAVIX®
(SANOFI-AVENTIS)



	FORMAT	TAILLE RÉELLE
BO	100	Comprimés
	500	



FORCE	CODE UPC • BO 100	CODE UPC • BO 500
75 mg	6 22082 29247 2	6 22082 29248 9

AV-AG-CLOPIDOGREL

12 novembre 2021

RX

CLOPIDOGREL

INFORMATIONS PRODUIT

USAGE THÉRAPEUTIQUE	Inhibiteur de l'agrégation plaquettaire
CLASSE THÉRAPEUTIQUE	20:12.18 Antiagrégants plaquettaires
INDICATION	<p>Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral (AVC) ou maladie artérielle périphérique établie</p> <p>- Indiqué dans la prévention secondaire des événements athérombotiques (infarctus du myocarde, AVC et décès d'origine vasculaire) chez les patients atteints d'athérosclérose attestée par un AVC, un infarctus du myocarde ou une maladie artérielle périphérique établie.</p> <p>Syndrome coronarien aigu</p> <p>En association avec de l'acide acétylsalicylique (AAS)</p> <p>- Indiqué dans la prévention secondaire précoce et à long terme des événements athérombotiques (infarctus du myocarde, accident vasculaire ischémique, décès d'origine cardiovasculaire et/ou ischémie réfractaire) chez les patients présentant un syndrome coronarien aigu sans sus- décalage du segment ST (c.-à-d., angine de poitrine instable ou infarctus du myocarde sans onde Q).</p> <p>Fibrillation auriculaire</p> <p>En association avec de l'AAS à faible dose</p> <p>- Indiqué pour la prévention des accidents athérombotiques et thromboemboliques, y compris l'accident vasculaire cérébral, chez les patients atteints de fibrillation auriculaire qui présentent au moins un facteur de risque d'accident vasculaire, pour lesquels l'anticoagulothérapie ne convient pas et qui présentent un faible risque hémorragique.</p>
INGRÉDIENT ACTIF	Clopidogrel (sous forme de bisulfate de clopidogrel)
INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX	Lactose anhydrous, cellulose microcristalline, crospovidone, dibéhénate de glycérol, talc, dioxyde de titane, alcool polyvinylique, oxyde ferrique rouge, macrogol et lécithine (soja).
DURÉE DE CONSERVATION	36 mois
ENTREPOSAGE	Conserver les comprimés entre 15-30 °C. Protéger de l'humidité.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

		UNITÉS	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)
Caisse	75 mg - Bo 100	216	42.6	38.8	19	10.6
Unité	75 mg - Bo 100	1	4.48	4.48	5.3	0.042
Caisse	75 mg - Bo 500	48	42.1	29.2	21.4	9.5
Unité	75 mg - Bo 500	1	6.7	6.7	9.25	0.174