

RX

ATORVASTATIN

DIN 02506076

Comprimés d'atorvastatine calcique 10 mg



PRODUIT DE RÉFÉRENCE
PLIPITOR®
 (PFIZER)

DIN 02506084

Comprimés d'atorvastatine calcique 20 mg



Code UPC • BI 30



Code UPC • Bo 500



TAILLE RÉELLE

Comprimés



Recto : 10 Verso : AT

Code UPC • BI 30



Code UPC • Bo 500



TAILLE RÉELLE

Comprimés



Recto : 20 Verso : AT

DIN 02506092

Comprimés d'atorvastatine calcique 40 mg



Code UPC • BI 30



Code UPC • Bo 500



TAILLE RÉELLE

Comprimés



Recto : 40 Verso : AT

DIN 02506106

Comprimés d'atorvastatine calcique 80 mg



Code UPC • BI 30



Code UPC • Bo 100



TAILLE RÉELLE

Comprimés



Recto : 80 Verso : AT

AV-AG-ATORVASTATIN CALCIUM

09mars2022

RX

ATORVASTATIN

INFORMATIONS PRODUIT

USAGE THÉRAPEUTIQUE	Régulateur du métabolisme des lipides
CLASSE THÉRAPEUTIQUE	24:06.08 Inhibiteurs de l'HMG-COA réductase
INDICATION	<p>Indiqué comme adjuvant aux changements du mode de vie, y compris l'adoption d'une diète, pour réduire les taux trop élevés de CT, de C-LDL, de triglycérides, d'apolipoprotéine B (apo B) et le rapport cholestérol total (CT)/C-HDL de même que pour accroître le taux de C-HDL dans les cas d'hyperlipidémie et de dyslipidémie.</p> <p>Prévention de la maladie cardiovasculaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - indiqué pour réduire le risque d'infarctus du myocarde chez l'adulte hypertendu n'accusant aucun signe clinique de maladie coronarienne, mais présentant au moins trois autres facteurs de risque coronarien, notamment âge ≥ 55 ans, sexe masculin, tabagisme, diabète de type 2, hypertrophie ventriculaire gauche, certaines anomalies de l'ECG, microalbuminurie ou protéinurie, rapport CT/C-HDL ≥ 6 et antécédents familiaux de maladie coronarienne précoce - indiqué pour réduire le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral (AVC) chez l'adulte atteint de diabète de type 2 et d'hypertension n'accusant aucun signe clinique de maladie coronarienne, mais présentant d'autres facteurs de risque, notamment âge ≥ 55 ans, rétinopathie, albuminurie ou tabagisme - indiqué pour réduire le risque d'infarctus du myocarde chez les patients présentant des signes cliniques de maladie coronarienne
INGRÉDIENT ACTIF	Atorvastatine (sous forme d'atorvastatine calcique)
INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX	Carbonate de calcium, croscarmellose sodique, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, monohydrate de lactose, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, polyéthylène glycol, polysorbate 80, talc et dioxyde de titane.
DURÉE DE CONSERVATION	24 mois
ENTREPOSAGE	Conserver : 15-30 °C. Protéger de l'humidité.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

		UNITÉS	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)
Caisse	10 mg - Bl. 30	100	39.5	25	29	2.7
Unité	10 mg - Bl. 30	1	13.4	2.3	7.3	0.02
Caisse	10 mg - Bo 500	72	32.5	23	33.5	9.2
Unité	10 mg - Bo 500	1	9.9	4.8	9.9	0.12
Caisse	20 mg - Bl. 30	100	39.5	25	29	3.2
Unité	20 mg - Bl. 30	1	13.4	2.3	7.3	0.024
Caisse	20 mg - Bo 500	30	35.5	23	25	14.8
Unité	20 mg - Bo 500	1	6.6	6.6	10.4	0.208
Caisse	40 mg - Bl. 30	80	39.5	25	30	3.5
Unité	40 mg - Bl. 30	1	13.5	2.7	7.5	0.038
Caisse	40 mg - Bo 500	24	32.5	26	32	9.8
Unité	40 mg - Bo 500	1	7.5	7.5	14.5	0.382
Caisse	80 mg - Bl. 30					
Unité	80 mg - Bl. 30					
Caisse	80 mg - Bo 100					
Unité	80 mg - Bo 100					

BIENTÔT DISPONIBLE